

Slokdarm echocardiografisch onderzoek – TEE

Inleiding

Hier leest u informatie over het slokdarm echocardiografisch onderzoek. Dit wordt ook wel Transoesofageale Echocardiografisch onderzoek of TEE genoemd. Hierbij wordt met behulp van (onhoorbare) geluidsgolven een afbeelding van uw hart gemaakt. Het onderzoek vindt plaats via de slokdarm, omdat een uitwendig echo-onderzoek voor uw specifieke afwijking onvoldoende gegevens oplevert. De slokdarm bevindt zich vlak achter het hart en daardoor kan het onderzoek gedetailleerde informatie opleveren.

Vorbereiding

Om dit onderzoek goed uit te kunnen voeren moet uw maag leeg zijn. Dit betekent dat u 6 uur voor het onderzoek niets mag eten en drinken. Als u medicijnen gebruikt kunt u deze met een klein slokje water innemen. Eventuele longmedicatie kunt u inhaleren. Voor suikerpatiënten (diabetici) geldt dat u met uw behandelend arts overlegt of u uw medicatie aan moet passen.

Het onderzoek

Het slokdarmecho-onderzoek wordt uitgevoerd door een cardioloog en een hartfunctielaborant en duurt ongeveer een half uur. Allereerst verdoven we uw keel met een spray en vragen wij u uw eventuele kunstgebit uit te doen. Deze verdovingspray heeft een bittere smaak. Hierna neemt u op uw linkerzijde plaats op een onderzoeksbank. Vervolgens wordt de slokdarm-echoslang in uw mond geplaatst. Terwijl u enkele slikbewegingen maakt, wordt de slang in uw slokdarm geschoven. Dit is het vervelendste deel van het onderzoek. Hierbij kunt u enige kokhalsneigingen krijgen maar de ademweg blijft vrij tijdens het onderzoek en u hoeft niet bang te zijn voor benauwdheid.

In sommige gevallen wordt het onderzoek tijdens een korte verdoving (narcose) gegeven. In dat geval wordt er een aparte afspraak gemaakt. Normaal gesproken is dit niet nodig.

Betere beeldkwaliteit

Soms is echocontrastvloeistof nodig om bepaalde structuren beter in beeld te krijgen. In dat geval brengen we een infuus aan in uw (onder)arm. Wanneer dit nodig is, bespreekt degene die het onderzoek uitvoert dit met u. Via het infuus (een naaldje in de arm) spuiten we het contrastmiddel in waardoor de beeldkwaliteit verbetert.

De uitslag

Als uw eigen cardioloog bij het onderzoek aanwezig is, krijgt u meteen de uitslag. Anders neemt uw cardioloog tijdens het volgende polikliniekbezoek de onderzoeksresultaten met u door.

Na het onderzoek

Na afloop mag u een uur lang niet eten of drinken. Het duurt namelijk even voordat de verdoving van de keelholte helemaal is uitgewerkt. Hierdoor kunt u zich gemakkelijk kunnen verslikken. Probeer u na een uur eerst voorzichtig een slokje water, gaat dit goed dan mag u het eten en drinken hervatten. Als u zich goed voelt mag u zelf autorijden.

Bericht van verhindering

Als u verhinderd bent, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk te laten weten zodat wij een andere patiënt op kunnen roepen? Belt u dan met telefoonnummer 0513 – 685 225.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

Vragen

Als u nog vragen heeft, neemt u dan contact op met de polikliniek Cardiologie. U kunt de polikliniek op werkdagen bellen van 8.30 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 16.00 uur, telefoonnummer 0513 – 685 225 of via www.mijntjongerschans.nl.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.