

## Splenectomie

De milt zorgt voor een goede afweer tegen bacteriën. Leven zonder milt of met een slechtwerkende milt brengt een verhoogd risico op (levensbedreigende) infecties met zich mee. Hier leest u welke maatregelen u kunt nemen om het risico op een infectie zo klein mogelijk te maken. De milt is een belangrijk orgaan dat zorgt voor een goede afweer tegen bacteriën. Dit doet de milt door:

- antistoffen te maken tegen bepaalde bacteriën;
- bacteriën en andere ziektekiemen uit het bloed te verwijderen.

### Leven zonder milt

Als u geen milt heeft (asplenie) of als uw milt niet goed werkt (hyposplenie) loopt u een verhoogd risico op levensbedreigende infecties. De meeste infecties treden op in de eerste twee jaar na het verwijderen van de milt, maar ook daarna blijft er een verhoogde kans op ernstige infecties bestaan. Levensbedreigende infecties worden vooral veroorzaakt door bacteriën die omgeven zijn door een kapsel. Dit zijn pneumokokken, de Haemophilus influenzae en meningokokken. Ook na dierenbeten kunnen in zeldzame gevallen ernstige infecties optreden. Bij een bezoek aan het buitenland heeft u een verhoogd risico om malaria of babesiose te krijgen.

### Voorkomen van infecties

Welke maatregelen adviseren wij om infecties te voorkomen?

- Gebruik onderhoudsantibiotica gedurende de eerste twee jaar.
- Zorg dat u altijd een noodvoorraad antibiotica bij zich heeft, voor het geval u koorts krijgt (ook na de eerste twee jaar).
- Laat u vaccineren.
- Reisplannen? Win tijdig advies in bij een GGD voor reizigersadvisering.
- Draag altijd een medical alert-kaart of een medaillon bij u.

### Onderhoudsantibiotica

Om te voorkomen dat er infecties optreden, adviseren wij u gedurende de eerste twee jaar na het verwijderen van uw milt of nadat uw milt minder goed is gaan werken, dagelijks antibiotica te gebruiken. Dit antibioticum heet feniticilline. U neemt eenmaal daags 500 mg. Als u overgevoelig bent voor penicilline dan wordt een ander antibioticum voorgeschreven.

### Noodvoorraad antibiotica

Na verwijdering van uw milt of nadat uw milt minder goed is gaan werken, zult u altijd een noodvoorraad antibiotica bij u moeten hebben. Het antibioticum dat u dient te hebben, heet Amoxicilline-clavulaanzuur. Bent u overgevoelig voor penicilline, dan schrijft de huisarts of behandelend specialist een ander middel voor. Let op de vervaldatum en haal op tijd nieuwe antibiotica met een herhaalrecept van de huisarts. Wanneer u koorts boven 38°C krijgt of zich koortsig voelt, neemt u direct (binnen 1 uur)

1 tablet van de noodvoorraad antibiotica in en daarna neemt u altijd contact op met uw huisarts of behandelend specialist. Buiten kantooruren en in het weekend neemt u contact op met de dokterswacht en benadrukt u dat u geen/niet goed werkende milt heeft. Wordt u door een hond of kat gebeten, neem dan contact op met uw huisarts of behandelend specialist. De wond moet worden schoongemaakt en u moet starten met een antibioticumkuur.

### Vaccinaties

Vaccinaties verminderen de kans op een ernstige infectie. Het beste is dat u verschillende vaccinaties krijgt voordat uw milt wordt verwijderd. Soms is dat niet mogelijk en dan schrijft de arts deze vaccinaties pas voor na een miltverwijdering.

Deze vaccinaties dient u te krijgen:

Vaccin	Voor de operatie	Na de operatie	Herhaling
Pneumokok (13-val)	>2 weken		
Pneumokok (23-val)	-	2 maand na	Elke 5 jaar
Meningokok ACWY	>2 weken		
Meningokok B	>2 weken		
Haemophilus influenza B	>2 weken		Eenmalig na 2 jaar
Grieprik	>2 weken		Jaarlijks

### Reisadvies

Als u een reis naar het buitenland plant, raden wij u aan om vroegtijdig advies in te winnen bij een GGD voor reizigersadvisering. Met name malaria-infecties kunnen zeer ernstig verlopen.

### Medical alert

Het is verstandig om een medical alert-kaart of een medaillon bij u te dragen waarop vermeld staat dat uw milt is verwijderd/uw milt minder goed werkt. Vertel ook zelf bij elk bezoek aan een huisarts of specialist dat u geen milt meer heeft/uw milt minder goed werkt.

### Contact

Heeft u nog vragen, dan kunt u bellen uw eigen huisarts of met de locatie waar u onder behandeling bent:

- Polikliniek Chirurgie, 0513 – 685 290, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur.
- Polikliniek Interne Geneeskunde, 0513 – 685 280, bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 16.30 uur

Heeft u binnenkort een afspraak? Dan vindt u tijd en plaats waar u verwacht wordt in uw afspraakbevestiging of op Mijntjongerschans.

### **Grip op uw zorg via Mijntjongerschans**

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op [www.mijntjongerschans.nl](http://www.mijntjongerschans.nl) met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

### **DISCLAIMER**

*Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.*