

Endoscopische ultrasonografie (EUS)

Uw afspraak:

U wordt verwacht op de afgesproken datum en tijd. In verband met de voorbereidingen dient u zich eerder te melden, overleg hierover met de assistente. U kunt uw afspraak ook terugvinden op: www.mijntjongerschans.nl

U meldt zich voor de afspraak bij de aanmeldzuil (in de centrale hal van het ziekenhuis).

Plaats

Behandel- en Endoscopiecentrum (begane grond) - [Route 42](#)

Mocht u voor dit onderzoek opgenomen worden, dan ontvangt u separaat bericht.

U dient nuchter te komen!

Na het onderzoek mag u niet aan het verkeer deelnemen in verband met de toegediende medicatie. Wij adviseren u daarom vooraf vervoer naar huis te regelen.

Wat is een endoscopische ultrasonografie?

Een endoscopische ultrasonografie is een onderzoek waarbij gebruik wordt gemaakt van een endoscoop. Dit is een flexibele dunne slang waarmee de arts inwendig onderzoek kan verrichten via de mond of anus. Bij een endoscopische echografie wordt een flexibele slang via de mond ingebracht. Aan het uiteinde van de slang zit een klein echo-apparaatje ingebouwd. Dit apparaatje zendt geluidsgolven uit. Hierdoor kunnen organen zoals de slokdarm en de maag, maar ook omliggende organen zoals de alvleesklier, de lever en de galwegen, in beeld gebracht worden.

Wat gebeurt er op de dag van het onderzoek?

U meldt zich aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal en volgt daarna route 42 naar het behandel- en endoscopiecentrum. U wordt door de verpleegkundige uit de wachtkamer meegenomen naar de zaal. Uw gegevens worden gecontroleerd, u krijgt een korte uitleg over het onderzoek en een infuusnaald in de hand of arm waardoor het slaapmiddel en de pijnstilling worden toegediend. Vervolgens wordt u op het bed naar de endoscopiekamer gebracht.

Tijdens het onderzoek wordt u bewaakt. Uw zuurstofgehalte, bloeddruk en hartritme worden gecontroleerd. U blijft tijdens het onderzoek op dit bed liggen. Losse gebitsdelen worden

uitgedaan. Als u geen gebitsprothese draagt, krijgt u een ring in de mond, om het bijten op de scoop te voorkomen. Als u een bril draagt wordt u verzocht om deze af te zetten.

Het onderzoek wordt gedaan onder sedatie. Deze procedure wordt uitgevoerd door een hiervoor speciaal opgeleide sedationist. U zult hierdoor weinig tot niets merken van het onderzoek. Tijdens het onderzoek ligt u op uw linkerzijde de onderzoekstafel. De endoscoop wordt via de mond ingebracht. De arts kan water inspuiten tijdens de scopie om een beter beeld te krijgen. Na het onderzoek wordt u naar de uitslaapkamer gebracht, daar wordt u nog een uur bewaakt. Als u voldoende wakker bent, bespreekt de arts de (voorlopige) uitslagen met u en mag u weer naar huis. Het eerste uur na het onderzoek mag u, vanwege een grotere kans op verslikken, nog niet eten of drinken.

Duur van het onderzoek

Het onderzoek duurt gemiddeld 45 minuten. Uw begeleider kan tussentijds naar huis gaan of gebruik maken van de wachtruimte. Houdt u er rekening mee dat de totale tijd van de opname ongeveer 3 uur is. Wij adviseren de begeleider om tijdens deze opname telefonisch bereikbaar te zijn.

Wie of wat neemt u mee?

- Een begeleider (wij raden u aan iemand mee te nemen)
- Makkelijke/comfortabele kleding

Direct behandelen

Tijdens de procedure kunnen stukjes weefsel en poliepen voor onderzoek verwijderd worden. Indien er weefselmonsters zijn genomen of poliepen verwijderd is de uitslag meestal binnen 8 tot 10 dagen bekend. U krijgt de uitslag via de afspraak die met uw arts wordt gemaakt.

Risico's en mogelijke complicaties

De kans op complicaties bij een endoscopische ultrasonografie is klein. Er kan na afloop van het onderzoek sprake zijn van keelpijn. Dit wordt veroorzaakt door het schuiven van de endoscoop. Deze pijn kan enkele dagen aanhouden en verdwijnt spontaan. Mogelijke complicaties zijn een longontsteking door verslikken, een scheuring van de wand van de slokdarm of maag-/darmbloedingen na het nemen van een punctie.

Wanneer u de dagen na het onderzoek buikpijn, koorts en/of aanhoudend bloedverlies heeft, is het van belang dat u contact opneemt met uw behandelend arts, eventueel via de huisarts.

Medicatie

Bloed verdunnende middelen

Om de kans op een nabloeding te verkleinen bespreekt uw behandelend arts hoe u met uw bloed verdunnende middelen om moet gaan. Acetylsalicylzuur mag door gebruikt worden.

Diabetes mellitus (suikerziekte)

Alleen tabletgebruikers:

www.tjongerschans.nl

- Geen tabletten nemen, ook niet als u een licht ontbijt mag gebruiken.

Kortwerkende insuline:

- Bij een scopie in de ochtend: geen insuline spuiten 's ochtends. U kunt dan vóór u weer gaat eten de normale hoeveelheid insuline spuiten.
- Bij een scopie in de middag: 's ochtends 50% van de normale hoeveelheid insuline spuiten.

Langwerkende insuline:

- Normale hoeveelheid spuiten.

Alle andere medicijnen kunt u 's morgens wel gewoon innemen.

Heeft u een sedatiefolder gekregen? Volgt u dan de medicatieadviezen uit de sedatiefolder.

Overig

Als u zwanger bent, een kunstmatige hartklep of een pacemaker heeft dient u dit aan te geven bij uw behandelend arts.

Vorbereiding

De maag is alleen goed en ook veilig te beoordelen wanneer deze leeg is. Daarom is het van belang om vanaf middernacht (de avond voor het onderzoek) niet meer te eten/drinken.

Vragen en telefoonnummers

Als u nog vragen heeft of als er problemen ontstaan, bel dan met één van de onderstaande nummers.

Secretariaat MDL artsen: 0513 – 685 454

Behandel- en endoscopiecentrum: 0513 – 685 435

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.

