

## HSG

HSG is de afkorting voor hysterosalpingografie. Contrastvloeistof wordt via een slangetje in de baarmoedermond ingebracht. Met behulp van röntgendoorlichting komt de binnenkant van de baarmoeder in beeld, vervolgens de eileiders en daarna kan het contrast in de buikholte worden gezien als de eileiders open zijn. Hystero slaat op baarmoeder, salpingo op eileiders en grafie betekent beschrijving.

### **Vorbereiding**

#### *Chlamydia-antistoffen*

Voorafgaand aan een HSG worden chlamydia-antistoffen in het bloed bepaald. Dit gebeurt gelijk met de bloedafname voor progesteron voor de cyclusanalyse. De uitslag moet bekend zijn voordat de foto wordt gemaakt. Als de antistoffen positief zijn, moet eerst een actieve infectie worden uitgesloten of behandeld.

#### *Timing HSG*

De foto wordt in het eerste deel van je cyclus, na de menstruatie en voor de ovulatie, gepland. Er mag immers geen contrast worden ingespoten als je net zwanger bent. Als je menstruatie begint, neem dan contact op met de poli voor een afspraak voor de foto. Vraag meteen of je antistoffen negatief zijn.

#### *Pijnstillers*

Als contrast in de baarmoeder wordt ingespoten, dan geeft dat een menstruatie-achtige pijn. We raden aan van te voren pijnstillers te gebruiken. Je kunt hiervoor Naproxen of Aleve bij de drogist kopen. Neem één tablet de avond van te voren in en één tablet een uur voor de afspraak. Als je allergisch bent voor Naproxen (NSAID), dan kan je Paracetamol gebruiken, maar dat werkt wat minder goed.

#### *Contrastmiddel*

Er wordt een contrastmiddel met jodium gebruikt. Ben je bekend met een allergische reactie op contrastmiddel? Bespreek dit met je gynaecoloog, want dan wordt het onderzoek aangepast.


### **Voor het onderzoek**

Vergeet je pijnstiller niet in te nemen. Meld je 10 minuten voor je afspraak bij de balie van de afdeling Radiologie. Je mag iemand meenemen.

### **Tijdens het onderzoek**

#### *Contrast*

Je ligt met je benen in de beensteunen. De gynaecoloog of physician assistant brengt een spreider (speculum) in. Het contrast wordt ingebracht met een slangetje dat in de baarmoeder wordt gebracht. Aan het uiteinde zit een ballonnetje dat opgeblazen wordt. Het inbrengen van het slangetje en het opblazen van het ballonnetje kan gevoelig zijn.



*het contrast wordt met een slangetje met ballon ingebracht*

### **Doorlichting**

Als de radioloog aanwezig is, wordt het contrast ingespoten. Dit kan je voelen als menstruatiepijn. Gelukkig helpen de pijnstillers goed en zo is het voor de meeste vrouwen prima te doen. Het duurt een paar minuten. Soms blijkt het slangetje niet goed te zitten en moet het opnieuw worden geplaatst. Samen met de gynaecoloog of physician assistant kijk je naar een scherm. Eerst komt de baarmoederholte, als een driehoekje, in beeld. Daarna komen de eileiders op, eerst heel dun en nauwelijks te zien. Aan het eind van de eileiders is er meer vulling. Tot slot loopt het contrast je buikholte in. Dat voel je niet. Op het scherm is nu een waaierachtig vervagend contrast te zien. Dan is het duidelijk dat de eileiders open zijn. Het slangetje wordt verwijderd. De druk in de baarmoeder verdwijnt en dan heb je geen pijn meer. Je krijgt van de gynaecoloog of physician assistant alvast een voorlopige uitslag.

### **Na het onderzoek**

Er kan wat bloedverlies zijn en je kan nog contrastvloeistof via de vagina verliezen. Heel soms ontstaat er een infectie na een HSG. Als je binnen enkele dagen toenemend buikpijn krijgt en koorts, neem dan direct contact met ons op. Je krijgt zo nodig antibiotica.

Mogelijk is er in de eerste maanden na de foto een iets hogere kans om zwanger te worden.

### **Verder plan**

Als de foto goed is, dan kan je met je gynaecoloog het verdere plan maken. Dit kan bestaan uit het advies nog af te wachten, te starten of door te gaan met een behandeling. Als er afwijkingen worden gezien aan de eileiders dan is het advies een kijkoperatie te laten doen. Daarna is pas echt duidelijk wat er aan de hand is met de eileiders. Heb je nog geen afspraak en weten jullie nog niet wat het verdere plan is, maak dan een afspraak op onze poli.

### **Contact opnemen als**

Laat ons zo mogelijk bijtijds weten als je verhinderd bent.

Krijg je toenemend buikpijn en/of koorts binnen enkele dagen, neem dan meteen contact op met onze poli.

**Contact**

Stel uw vraag via [www.mijntjongerschans.nl](http://www.mijntjongerschans.nl) of bel 0513 – 685 245.

**Grip op uw zorg via Mijntjongerschans**

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op [www.mijntjongerschans.nl](http://www.mijntjongerschans.nl) met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

**DISCLAIMER**

*Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo weinig mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.*