

Behandeling met Imiquimod

De behandeling met Imiquimod duurt 16 weken. Je gebruikt de crème driemaal per week. Imiquimod moet vaginaal worden ingebracht met een tampon. Doe dit 's avonds voor het slapengaan. Je knijpt het zakje met zalf leeg op de punt van de tampon en brengt deze vaginaal in. Je mag daarna geen geslachtsgemeenschap meer hebben. 's Ochtends verwijder je de tampon en spoel je de restjes crème onder de douche weg. Wij adviseren om de ochtend na het inbrengen van de crème een nieuwe tampon te gebruiken, zodat een eventueel restant van de crème de schaamlippen niet irriteert.

Vervolgafspraken

6 maanden na de beëindiging van de behandeling met Imiquimod volgt een controle uitstrijkje. Als dit uitstrijkje nog afwijkend is volgt in overleg opnieuw een colposcopie, of (afhankelijk van de ernst van de afwijking) toch een lisexcisie.

Bijwerkingen

In onderzoeken met Imiquimod crème werden weinig ernstige bijwerkingen beschreven. De meest voorkomende bijwerking was vaginale afscheiding tijdens de behandeling en soms ook wat pijn of jeuk van de schaamlippen of in de vagina. Andere bijwerkingen die kunnen voorkomen zijn spierpijn en spierstijfheid, vermoeidheid, hoofdpijn en een koortsig gevoel.

Wat te doen bij bijwerkingen

Bij pijn of jeuk van de schaamlippen kun je de schaamlippen voor het aanbrengen van de crème en 's ochtends na het afspoelen onder de douche insmeren met Vaseline. Krijg je klachten van spierpijn en spierstijfheid, vermoeidheid, hoofdpijn en/of een koortsig gevoel, neem dan kun je 3 keer per dag 2 x 500 mg paracetamol nemen, en zo nodig maximaal 3 x per dag 400 mg Ibuprofen. Als de klachten aanhouden kun je het aanbrengen van de zalf één keer overslaan.

Belangrijk om te weten

Je mag tijdens de behandeling met Imiquimod niet zwanger worden. Je moet daarom anticonceptie gebruiken tijdens de behandelperiode. Gebruikt u nog géén anticonceptie, dan kan de gynaecoloog of physician assistant je adviseren over de mogelijkheden. De crème tast condooms aan, dus deze zijn niet geschikt als anticonceptie. Gedurende de menstruatie kun je doorgaan met het gebruik van Imiquimod. Je mag op een dag met hevig bloedverlies eventueel het gebruik van de crème eenmalig overslaan. In die week gebruik je dan tweemaal per week Imiquimod.

Contact

Heb je na het lezen van deze informatie nog vragen, neem dan contact op met Evelien Adema (physician assistant) of de behandelend gynaecoloog. Stel je vraag via www.mijntjongerschans.nl of bel 0513 – 685245.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo weinig mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar

het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.