

Logopedisch slikonderzoek

Belangrijk: röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, neem dan contact met ons op! Als u hierover twijfelt, moet het onderzoek binnen 10 dagen na het begin van de menstruatie plaatsvinden.

U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor een slikonderzoek in het bijzijn van een logopedist. Voorafgaand aan dit onderzoek wordt u op de afdeling Logopedie verwacht voor een kort intakegesprek. De informatie die u hier leest is algemeen van aard. Dat wil zeggen dat het onderzoek is beschreven zoals dit meestal verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest, die beter aansluit bij uw situatie.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is de slikfunctie zichtbaar maken met behulp van een contrastmiddel. Hiermee kan mogelijk de oorzaak van uw klachten worden vastgesteld.

Voor het onderzoek

Het is niet nodig om voor dit onderzoek nuchter te zijn. Medicijnen mag u op de gebruikelijke manier innemen. Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis. Er is een kleedkamer aanwezig. Als u een BH draagt, moet u deze uittrekken. U mag een hemd of shirt zonder knopen of ritsen aan houden tijdens het onderzoek. U wordt verzocht zich tien minuten voor de afgesproken tijd bij de aanmeldzuil aan te melden. Na het intakegesprek bij de logopedist gaat u samen naar de afdeling Radiologie. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer.

Tijdens het onderzoek

U krijgt een bekertje met contrastmiddel waarvan u een slok in de mond neemt. U wacht met doorslikken tot de radioloog u een teken geeft. Als het nodig is, wordt er ook vast voedsel gebruikt. De radioloog vraagt u om in verschillende richtingen te draaien en tijdens het maken van de opnames niet te bewegen. Het onderzoek zal ongeveer een kwartier duren.

Na het onderzoek

Na het onderzoek kan uw ontlasting nog enkele dagen wit van kleur zijn. Om de pap zo snel mogelijk kwijt te raken en om verstopping te voorkomen moet u de eerste twee dagen minimaal een liter extra drinken. Wanneer u last heeft van een trage stoelgang kunt u eventueel een laxeermiddel (Bisacodyl) innemen.

Uitslag

De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag zult krijgen.

Bent u verhinderd?

Wilt u bij verhindering tijdig contact met ons opnemen? Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u.

Vragen

Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen? Dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie via 0513 – 685 771. Een vraag stellen kan ook via Mijntjongerschans.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.