

Gebruik van premedicatie Paclitaxel wekelijks

Medicijnen tegen misselijkheid en braken worden ook wel anti-emetica genoemd..
 Deze medicijnen krijgt u via de poliklinische apotheek van het ziekenhuis.
 Deze medicatie neemt u voorafgaand aan de kuur thuis in.

Kuur 1:

1 uur voor de chemotherapie	Dexamethason 4 mg Levocetirizine 5 mg
-----------------------------	--

Kuur 2:

1 uur voor de chemotherapie	Dexamethason 2 mg Levocetirizine 5 mg
-----------------------------	--

Vanaf kuur 3:

1 uur voor de chemotherapie	Levocetirizine 5 mg
-----------------------------	---------------------

Dexamethason:

Dit medicijn kan een rode gelaatskleur veroorzaken en u kunt er onrustig van worden.

Levocetirizine:

Dit medicijn kan vermoeidheid veroorzaken en daardoor de rijvaardigheid beïnvloeden.

Mocht u toch nog misselijk zijn, kunt u zo nodig gebruik maken van metoclopramide.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stel ze dan voor het onderzoek aan uw arts, de verpleegkundige of aan een van de medewerkers.

Contact

Stel uw vraag via www.mijntjongerschans.nl of bel 0513 – 685 495.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo weinig mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar

het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.