

Gebruik van medicatie tegen misselijkheid en braken: Categorie 3

Medicijnen tegen misselijkheid en braken worden ook wel anti-emetica genoemd. Deze baxter krijgt u via de poliklinische apotheek van het ziekenhuis. Hierin bevindt zich de medicatie die u een aantal dagen bij de kuur moet gebruiken.

In de baxter zijn de volgende medicijnen aanwezig:

Dag 1: 1 uur voor de chemotherapie	Granisetron 2 mg Dexamethason 8 mg
Dag 2:	Dexamethason 8 mg
Dag 3:	Dexamethason 8 mg

Dexamethason:

Neem bij voorkeur 's ochtends in één keer de tabletten in, dus niet verdelen over de dag. Dit medicijn kan een rode gelaatskleur veroorzaken en u kunt er onrustig van worden.

Granisetron:

Dit medicijn kan hoofdpijn en een verstopping van de darmen veroorzaken.

Wij raden u aan de medicijnen op een vast moment van de dag in te nemen, zodat u de meest optimale bescherming heeft tegen de misselijkheid. Mocht u toch nog misselijk zijn, dan kunt u gebruik maken van Metoclopramide.

Vragen

Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, stel ze dan voor het onderzoek aan uw arts, de verpleegkundige of aan een van de medewerkers.

Contact

Stel uw vraag via www.mijntjongerschans.nl of bel 0513 – 685 495.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo weinig mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.