

Dermatochalasiscorrectie of blepharoplastiek

Het goed functioneren van de ogen hangt mede af van de positie en functie van de oogleden. Bovendien hebben de oogleden grote invloed op het uiterlijk. De meest voorkomende afwijking van de bovenoogleden is een teveel aan huid (dermatochalasis). Deze afwijking kan irritatie van de ogen en verslechtering van het zien tot gevolg hebben. Een operatie kan een uitkomst bieden. De ingrepen kunnen in verreweg de meeste gevallen het beste door uw eigen oogarts verricht worden.

Oorzaak

De huid van de oogleden is dun en daardoor gevoelig voor uitrekking. Veel mensen ontwikkelen dan ook in de loop der jaren een teveel aan huid in de oogleden (mede veroorzaakt door het verdwijnen van de elastine vezels). Wanneer de huid echter over de ooglidrand hangt veroorzaakt die functionele beperkingen van het bovenste gezichtsveld. Ook kan vet uit de oogkas naar voren komen door verslapping van het onderhuidse bindweefsel (blepharochalazis). Veroudering veroorzaakt soms een lagere positie van de wenkbrauw. Dit kan van invloed zijn op het resultaat van de correctie. Het kan dan noodzakelijk zijn om de wenkbrauw(en) te 'liften'.

Operatie

De operatie gebeurt onder plaatselijke verdoving. Het teveel aan huid en vet wordt verwijderd. Na de operatie sluit het oog vaak wat slechter. Hierdoor kan tijdelijk een gevoel van irritatie of zanderigheid optreden, eventueel kan uw oogarts kunststranen of gel voorschrijven. Direct na de ingreep krijgt u vaak even een ijsbril op om zwelling te beperken. De hechting waarmee het wondje wordt gesloten, moet na een week weer worden verwijderd op de polikliniek Oogheelkunde. Het litteken van de operatie valt weg in de huidplooi.

Complicaties

Een lichte asymmetrie (ongelijkheid) in de hoogte en vorm van de huidplooi of de littekens kan voorkomen. Ernstige complicaties als een wondinfectie of een bloeding achter de oogbol komen zelden voor. Wanneer na een ooglidoperatie het oog naar voren komt of het zicht wordt slechter dient u direct contact op te nemen met de polikliniek Oogheelkunde.

Kosten

Wanneer het teveel aan huid halverwege de pupilopening hangt, dan is er sprake van een medische indicatie en wordt de operatie door uw verzekering vergoed. In het algemeen zal uw oogarts vooraf toestemming voor de ingreep aan uw zorgverzekeraar vragen. Bovendien zal de doktersassistente een foto maken van de oogleden om de situatie vast te leggen.

Niet al deze informatie is noodzakelijk op u van toepassing. Heeft u na het lezen van deze folder nog vragen, stel deze dan aan uw eigen oogarts of via Mijntjongerschans.

Bij verhindering

Bent u verhinderd? Neem dan tijdig contact met ons op via telefoonnummer 0513 - 685 420.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.