


## Carpaal Tunnel Syndroom

Carpaal tunnel syndroom is een afwijking die wordt veroorzaakt door een ingeklemde zenuw in de pols. In de pols is een ruimte aanwezig die carpaal tunnel wordt genoemd. In deze tunnel bevinden zich de medianuszenuw (zie figuur 1) en buigpezen die doorlopen vanuit de onderarm naar de hand (zie figuur 2). Een carpaal tunnel syndroom ontstaat door een vernauwing en/of zwelling in deze tunnel. Wanneer de druk groot genoeg wordt, ontstaat er een belemmering in de functie van de zenuwvezels en in ernstige gevallen zelfs een beschadigde zenuw. Dit veroorzaakt doofheid, prikkelingen, pijn in de arm, hand en vingers.



**fig. 1**  
 Overzicht van de functie van de medianus zenuw

**fig. 2**  
 de carpal tunnel bevindt zich aan de basis van de handpalm. Het bestaat uit polsbeentjes en het dwarse carpal ligament. Verhoogde druk in deze tunnel beschadigt de functie van de medianus zenuw



### Waardoor wordt het veroorzaakt?

Een algemene oorzaak voor verhoogde druk in de tunnel is toename van zwelling in de peesschede, welke ook wel tenosynovitis wordt genoemd. Veelvuldig gebruik van de hand – overbelasting - kan dan de druk in de tunnel doen verhogen. Verplaatste stukjes bot, breuken en artritis (ontsteking van het gewricht) kunnen de tunnel vernauwen, maar dit is zeldzaam. Vochtophoping gedurende zwangerschap kan soms zwelling veroorzaken in de tunnel en het beeld van een carpaal tunnel syndroom. Bepaalde ziektes, zoals te traag werkende schildklier, reuma en diabetes kunnen een carpaal tunnel syndroom veroorzaken. Meestal zien we het bij vrouwen en zonder duidelijke oorzaak.

## Klachten

De symptomen van het carpaal tunnel syndroom zijn meestal: pijn, doofheid, prikkelen of een combinatie van deze drie in één of beide handen. De doofheid en het prikkelen ontstaan meestal in de duim, wijs- en middelvinger en soms in de ringvingers. Meestal voelt men deze klachten 's nachts, maar ze kunnen ook ontstaan bij dagelijkse activiteit zoals autorijden of krant lezen. Sommige patiënten kunnen minder goed grijpen en laten bepaalde dingen vallen. In ernstige gevallen ontstaat er een onherstelbaar gevoelsverlies en de spieren in de bal van de duim verdwijnen (tenar atrofie).

## Diagnose


Het is van belang voor de arts te weten op welke wijze de handen de laatste jaren zijn gebruikt, of een ongeval heeft plaatsgevonden en wat precies de klachten zijn. Soms is een röntgenfoto nodig om andere oorzaken zoals artritis (ontsteking van het gewricht) of bijvoorbeeld een oude fractuur uit te sluiten. Soms is laboratoriumonderzoek nodig om te zien of bepaalde ziektes, zoals schildklierafwijkingen, aanwezig zijn. Onderzoek door de neuroloog en een zenuwgeleidingsonderzoek (elektromyograaf = E.M.G.) is absoluut noodzakelijk. Enerzijds om de diagnose te bevestigen, anderzijds om te zien of er niet elders een druk op de zenuw aanwezig is zoals bijvoorbeeld in de onderarm, schouder of nek.

## Behandeling

Soms kan men de klachten behandelen zonder een operatie. Verminderen van belastend gebruik of vermijden van herhaalde overbelasting of door het gewricht in een bepaalde houding te fixeren, kan de zwelling doen verdwijnen, waardoor er meer ruimte ontstaat voor de zenuw. De nachtelijke pijn kan soms verdwijnen indien men dan 's nachts een spalkje draagt. Ook kunnen bepaalde medicijnen (tabletten) worden gegeven of injecties in de carpaal tunnel worden toegediend welke de klachten doen verminderen doordat ze de zwelling in de carpaal tunnel wegnemen.

Bij zeer forse klachten die niet verbeteren, is een operatie nodig om de carpaal tunnel te vergroten. De druk op de zenuw wordt verminderd, indien het ligament (=band) welke het dak van de tunnel vormt aan de palmzijde van de hand (zie figuur 3) wordt gekliefd.

**fig. 3**  
*Doel van de operatie is het ligament te klieven om in de carpaal tunnel meer ruimte te krijgen voor de medianus zenuw.*



Dit kan op verschillende wijzen gebeuren en het resultaat is hetzelfde (vergroten van de tunnel en verminderen van de druk op de zenuw).

De operatie in ons ziekenhuis gebeurt vrijwel altijd onder plaatselijke verdoving in de pols en de hand. Er komt circa 5 minuten een bloedleegteband om de bovenarm zodat de orthopedisch chirurg 'bloedloos' kan opereren. Na de operatie kan men vrijwel direct naar huis. Na enkele dagen kan men de hand weer voor kleine dingen gebruiken.

Voor de operatie dient u alle handsieraden af te doen.

### **Postoperatieve instructies na de operatie**

#### *Bewegen en belasten*

U mag de hand direct normaal bewegen en licht belasten. Het is van belang dat u de vingers regelmatig beweegt om stijfheidsklachten te voorkomen. Bij zwaardere belasting kan tot enkele maanden nog gevoeligheid in de pols optreden, dit kan geen kwaad, geadviseerd wordt de belasting dan aan te passen.

#### *Wond en verband*

U hoeft geen mitella te dragen. Wel is het verstandig om de eerste 2 dagen na de operatie de hand in rust hoog te houden tegen de zwelling. Hechtingen zijn niet oplosbaar en blijven 12 dagen zitten. Het handverband minstens een week laten zitten, zodat de wond droog en schoon blijft. U kunt het handverband ook gerust laten zitten totdat de hechtingen worden verwijderd. Als het handverband te strak zit mag u het lossen maken.

#### *Controle*

Over 12 dagen bij de huisarts voor het verwijderen van het handverband en hechtingen.

#### *Bij problemen*

Heeft u bijvoorbeeld een hele dikke hand, een wond die maar blijft lekken, veel pijn, koorts etc. Dan kunt u op werkdagen bellen naar Orthoradius op het nummer 0513 - 685 335 en vragen om een vervroegde controle.

### **Tot slot**

Na de operatie kan er enige tijd een vervelend gevoel ontstaan rondom de operatiewond. Dit kan soms weken tot maanden duren. De doofheid en vooral het prikkelen verdwijnen meestal snel. Het kan maanden duren voordat de kracht in de hand en de pols tot normale proporties terugkeert. Af en toe blijven de klachten, ondanks operatie, voortbestaan. Indien men in het werk terugkeert waarbij opnieuw de pols wordt overbelast, kunnen de klachten soms terugkeren. In zijn algemeenheid is na operatie een goed resultaat te verwachten in meer dan 90% van de gevallen.

**Grip op uw zorg via Mijntjongerschans**

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op [www.mijntjongerschans.nl](http://www.mijntjongerschans.nl) met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

**DISCLAIMER**

*Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.*