

Hysterosalpingografie (HSG) – Onderzoek van de baarmoeder en de eileiders

Belangrijk!

Het onderzoek kan niet plaatsvinden tijdens de menstruatie of gedurende de zwangerschap.

U bent door de gynaecoloog naar de afdeling Radiologie verwezen voor een hysterosalpingografie (HSG) onderzoek. Hier leest u hoe dit onderzoek over het algemeen verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest die beter aansluit bij uw situatie. Omdat we niet alle varianten en alternatieven kunnen vermelden, leest u hier over het algemene onderzoek zoals die meestal verloopt.

Doel van het onderzoek

Doel van het HSG-onderzoek is het zichtbaar maken van de baarmoeder en het vaststellen van de doorgankelijkheid van de eileiders met behulp van een contrastmiddel. Hiermee kan mogelijk de aard van uw klachten worden vastgesteld.

Om te voorkomen dat een eventuele zwangerschap door dit onderzoek wordt onderbroken, vindt dit onderzoek normaal gesproken plaats in de eerste twee weken van de menstruatiecyclus. Soms wordt een HSG-onderzoek gedaan als controle na een sterilisatie en is het tijdstip van de cyclus niet van belang.

Voor het onderzoek

Trek gemakkelijke kleding aan. Wij raden u aan om een half uur voor het onderzoek een pijnstiller te nemen voor de krampen die dit onderzoek kan veroorzaken.

U meldt zich aan bij de aanmeldzuil in de centrale hal. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar het kleedkamertje. Daar wordt u verteld wat u uit kunt trekken. De laborant haalt u via de andere deur uit het kleedkamertje.

Tijdens het onderzoek

U kunt plaatsnemen op de onderzoekstafel. De vagina en de baarmoedermond worden door de gynaecoloog gedesinfecteerd. Daarna wordt een speculum (eendenbek) ingebracht. Vervolgens wordt een katheter in de baarmoedermond geplaatst. Het speculum wordt weer verwijderd. Via de katheter wordt contrastvloeistof in de baarmoederholte gespoten en worden opnames gemaakt door de radioloog (de arts die het onderzoek uitvoert). Bij het maken van de opnames kunt u meekijken op het beeldscherm.

Tijdens het onderzoek kan de baarmoeder reageren met krampen, zoals tijdens het begin van de menstruatie. Dit is normaal. Na het maken van de opnames wordt de katheter verwijderd. Het is mogelijk dat u daarna iets bloed verliest. Daarom krijgt u van de laborante een maandverband mee om de contrastvloeistof en eventueel bloed op te vangen. Het onderzoek zal in totaal ongeveer een half uur duren.

Na het onderzoek

De contrastvloeistof wordt vanzelf in het lichaam opgenomen. In enkele gevallen heeft dit onderzoek zelfs als resultaat dat de eileiders beter doorgankelijk worden. Hierdoor wordt bij kinderwens de kans op een zwangerschap groter. Na afloop van het onderzoek wordt soms na ongeveer een half uur een opname gemaakt om te kijken hoe de contrastvloeistof zich in de buikholte verspreidt.

Uitslag

De gynaecoloog heeft met u besproken op welke wijze u de uitslag zult krijgen.

Tot slot

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie via 0513 - 685 771 of met de afdeling Gynaecologie via 0513 – 685 245.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.