

Dubbel-J - Het inbrengen van een slangetje in het afvoersysteem van een nier naar de blaas

Belangrijk!

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact met ons op. Als u hierover twijfelt, moet het onderzoek binnen 10 dagen na het begin van de menstruatie plaatsvinden.

U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor het inbrengen van een dubbel-J katheter (dun, hol slangetje) in het afvoersysteem van de nier naar de blaas. Na overleg met uw arts heeft u hiermee ingestemd. Hier leest u hoe dit onderzoek over het algemeen verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest die beter aansluit bij uw situatie. Omdat we niet alle varianten en alternatieven kunnen vermelden, leest u hier over het algemene onderzoek zoals die meestal verloopt.

Doel van de behandeling

Het doel van deze behandeling is het inbrengen van een dubbel-J katheter in het afvoersysteem van uw nier naar de blaas; zodat de urine weer kan afvloeien naar de blaas. Het inbrengen van de dubbel-J katheter wordt gedaan met röntgenstraling en eventueel echografie. Het echografieonderzoek wordt uitgevoerd met een transducer. Dat is een apparaatje dat lijkt op een microfoon. De transducer zendt geluidsgolven uit die voor de mens onhoorbaar zijn. Het orgaan dat onderzocht wordt, weerkaatst de geluidsgolven (echo's). De echo's worden door de transducer opgevangen en via een computer omgezet in lichtpuntjes. Deze zijn op de monitor te zien en vormen samen een beeld van het orgaan. De monitorbeelden worden opgeslagen in de computer.

Vorbereiding

Voor deze behandeling is een (dag)opname noodzakelijk. Als u nog niet bent opgenomen, maakt de afdeling Radiologie voor u een afspraak met het daghospitaal, zodat u zich op de dag van de behandeling op de afgesproken tijd bij de aanmeldzuil aan kunt melden. Bij een (dag)opname wordt u op de verpleegafdeling/daghospitaal voorbereid op de behandeling. U mag licht ontbijten (kop thee, eventueel met suiker en een beschuit met boter en beleg). Daarna mag u niet meer eten, drinken en roken.

Medicijnen

Gebruikt u bloedverdünnende medicijnen, dan moet u, na overleg met uw behandelend arts, zonodig tijdelijk met deze medicijnen stoppen.

Voor het onderzoek wordt uw bloed gecontroleerd, als dat te dun is kan het onderzoek niet doorgaan.

De overige medicijnen die u gebruikt kunt u gewoon innemen. Het is erg belangrijk dat u, ter controle, alle medicijnen die u gebruikt (ook zonder doktersrecept) meeneemt

naar het ziekenhuis. De verpleegkundige controleert of wij daar bij de behandeling rekening mee moeten houden.

Voor de behandeling

Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis. U wordt in een bed naar de afdeling Radiologie gebracht. Als u aan de beurt bent haalt de laborant u op.

Tijdens de behandeling

U neemt plaats op de onderzoekstafel. De radioloog (de arts die de behandeling gaat uitvoeren) zal met behulp van echografie de plaats bepalen waar hij gaat prikken. Om de geluidsgolven goed te geleiden wordt het te behandelen lichaamsdeel ingesmeerd met gel. De radioloog beweegt de transducer over de huid. Dit kan een drukkend gevoel geven, maar is niet pijnlijk. Na markering van de aanprikplaats wordt de huid gedesinfecteerd. Rondom de aan te prikken plaats worden steriele doeken geplakt om infecties te voorkomen. De radioloog geeft u een verdovingsprikje.

Het afvoersysteem van de nier wordt aangeprikt met een dunne holle naald. Door deze naald wordt een voerdraad opgeschoven naar de blaas. Over deze draad wordt een dubbel J-katheter geschoven die in het afvoersysteem van de nier naar de blaas blijft liggen. De positie van de katheter wordt gecontroleerd met een röntgenopname en contrastvloeistof. Daarna wordt eventueel nog een katheter in het afvoersysteem van de nier zelf gelegd om eventuele bloedstolsels die kunnen zijn ontstaan, makkelijker af te kunnen voeren. Het uiteinde van deze katheter wordt op de huid vastgezet en aangesloten op een opvangzakje.

Als u in een eerder stadium al een nefrostomie katheter in het afvoersysteem van de nier gekregen heeft, kunnen we de dubbel-J katheter via de al aanwezige katheter inbrengen en hoeft de nier dus niet opnieuw te worden aangeprikt. De behandeling zal ongeveer een uur duren.

Na de behandeling

Na de behandeling verblijft u nog twee uur op de verpleegafdeling en heeft u bedrust. In geval van een dagopname mag u daarna naar huis.

Uitslag

De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag zult krijgen.

Tot slot

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie via 0513 - 685 771.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.