

Herniografie - Onderzoek van de buikwand of buikholte

Belangrijk!

Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact met ons op. Als u hierover twijfelt, moet het onderzoek binnen 10 dagen na het begin van de menstruatie plaatsvinden.

Inleiding

U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor een onderzoek van de buikwand of buikholte. In overleg met uw arts heeft u hiermee ingestemd. Hier leest u hoe dit onderzoek over het algemeen verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest die beter aansluit bij uw situatie. Omdat we niet alle varianten en alternatieven kunnen vermelden, leest u hier over het algemene onderzoek zoals die meestal verloopt.

Doel van het onderzoek

Het doel van het onderzoek is het zichtbaar maken van een gedeelte van de buikwand of buikholte met behulp van een contrastmiddel. Hiermee kan mogelijk de oorzaak van uw klachten, zoals een mogelijke liesbreuk, worden vastgesteld.

Vorbereiding

Dieet

U mag 's ochtends licht ontbijten (kop thee eventueel met suiker en een beschuit met boter en beleg). Daarna mag u niet meer eten, drinken en roken.

Medicijnen

De medicijnen die u gebruikt kunt u gewoon innemen. Het is erg belangrijk dat u, ter controle, alle medicijnen die u gebruikt (ook zonder doktersrecept) meeneemt naar het ziekenhuis. De verpleegkundige controleert of wij daar bij de behandeling rekening mee moeten houden.

Kleding en sieraden

Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.

Voor het onderzoek

U meldt zich aan bij de aanmeldzuilen in de centrale hal. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Voorafgaand aan het onderzoek wordt u gevraagd om de blaas goed leeg te plassen. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar het kleedkamertje. Daar wordt u verteld wat u uit kunt trekken. De laborant haalt u via de andere deur uit het kleedkamertje.

Tijdens het onderzoek

U kunt plaatsnemen op de onderzoekstafel. De huid, links naast de navel, wordt schoongemaakt en gedesinfecteerd. Rondom de aan te prikken plaats worden steriele doeken geplakt, ter voorkoming van infecties. Dit onderzoek wordt onder plaatselijke verdoving uitgevoerd. Met een dunne holle naald prikt de radioloog tussen het buikvlies. Als de naald goed zit, wordt contrastvloeistof ingespoten. De naald wordt verwijderd en er komt een pleister op het wondje. Vervolgens wordt gevraagd om in verschillende richtingen te draaien, zodat het contrastmiddel goed verdeeld wordt in de buikholte. De onderzoekstafel wordt schuin gezet, waarna opnames gemaakt worden. Tijdens het maken hiervan wordt aan u gevraagd om de adem in te houden of om te persen (bolle buik maken). Het onderzoek zal ongeveer een half uur duren.

Uitslag

De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag krijgt.

Tot slot

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie via 0513 - 685 771.

Grip op uw zorg via Mijntjongerschans

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op www.mijntjongerschans.nl met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

DISCLAIMER

Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.