

## Logopedisch slikonderzoek

### **Belangrijk!**

*Röntgenstralen kunnen schadelijk zijn voor het ongeboren kind. Als u zwanger bent of denkt te zijn, neemt u dan contact met ons op. Als u hierover twijfelt, moet het onderzoek binnen 10 dagen na het begin van de menstruatie plaatsvinden.*

### **Inleiding**

U bent door uw arts naar de afdeling Radiologie verwezen voor een slikonderzoek in het bijzijn van een logopedist. Na overleg met uw arts heeft u hiermee ingestemd. Voorafgaand aan dit onderzoek wordt u op de afdeling Logopedie verwacht voor een kort intake gesprek. Hier leest u hoe dit onderzoek over het algemeen verloopt. Het kan zijn dat de arts een andere methode kiest die beter aansluit bij uw situatie. Omdat we niet alle varianten en alternatieven kunnen vermelden, leest u hier over het algemene onderzoek zoals die meestal verloopt.

### **Doel van het onderzoek**

Het doel van dit onderzoek is de slikfunctie zichtbaar maken met behulp van een contrastmiddel. Hiermee kan mogelijk de oorzaak van uw klachten worden vastgesteld.

### **Vorbereiding**

#### *Medicijnen*

Medicijnen mag u op de gebruikelijke manier innemen.

#### *Kleding en sieraden*

Trek gemakkelijke kleding aan en laat sieraden zoveel mogelijk thuis.

### **Voor het onderzoek**

U meldt zich aan bij de aanmeldzuil. Daarna kunt u plaatsnemen in de wachtkamer. Na het intakegesprek bij de logopedist gaat u samen naar de afdeling Radiologie. U kunt plaatsnemen in de wachtkamer. Als u aan de beurt bent, haalt de laborant u op en brengt u naar het kleedkamertje. Daar wordt u verteld wat u uit kunt trekken. De laborant haalt u via de andere deur uit het kleedkamertje.

### **Tijdens het onderzoek**

U neemt plaats op de onderzoekstafel. U krijgt een bekertje met contrastmiddel waarvan u een slok in de mond neemt. U wacht met doorslikken tot de radioloog u een teken geeft. Indien nodig wordt er ook vast voedsel gebruikt. De radioloog vraagt u om in verschillende richtingen te draaien en tijdens het maken van de opnames niet te bewegen. Het onderzoek duurt ongeveer een kwartier.

### **Na het onderzoek**

Na het onderzoek kan uw ontlasting nog enkele dagen wit van kleur zijn. Om de pap zo snel mogelijk kwijt te raken en om verstopping te voorkomen moet u de eerste twee

dagen minimaal een liter extra drinken. Wanneer u last heeft van een trage stoelgang kunt u eventueel een laxeermiddel (Bisacodyl) innemen.

### **Uitslag**

De aanvragend arts heeft met u besproken op welke manier u de uitslag zult krijgen.

### **Tot slot**

Bij verhindering verzoeken wij u tijdig contact met ons op te nemen. Hierdoor kunnen wij de voor u geplande tijd voor andere patiënten gebruiken. Wij maken dan een nieuwe afspraak met u. Heeft u na het lezen van deze informatie nog vragen, dan kunt u deze stellen voorafgaand aan het onderzoek. Bovendien kunt u van maandag tot en met vrijdag tussen 8.00 en 16.00 uur telefonisch contact opnemen met de afdeling Radiologie via 0513 - 685 771.

### **Grip op uw zorg via Mijntjongerschans**

Mijntjongerschans.nl is het patiëntenportaal van ziekenhuis Tjongerschans. Dit portaal is bereikbaar voor alle patiënten die zijn ingeschreven bij Tjongerschans. Na het inloggen op [www.mijntjongerschans.nl](http://www.mijntjongerschans.nl) met DigiD met sms-verificatie of via de DigiD app heeft u toegang tot uw medische gegevens. U kunt hier ook afspraken maken, een vraag stellen, vragenlijsten invullen en uitslagen bekijken.

### **DISCLAIMER**

*Wij adviseren u bij uw bezoek aan de polikliniek en bij opname zo min mogelijk geld, sieraden, dure kleding en andere zaken van (emotionele) waarde mee te nemen naar het ziekenhuis. Het ziekenhuis aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan of verlies van dergelijke zaken.*